

□□ □□□ □□. 8

□□(□□□): □□□

□□: □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

“□□ □□□ □□. 7.docx

□□

□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□?”

□, □□□□□ □□□□ \*\*“□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□?”\*\*□□ □□□ □□, □□□□□ \*\*□□□ □□□ □□. 7□\*\* □□□ \*\*□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□\*\*□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□□:

---

## \*\*1. □□□□□ □□□□ □□ □□ □□\*\*

□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□:

- □□□□ □□  $(q_n = a_n + b_n i + c_n j + d_n k)$  □ □□□□□ □□□□ □□:  $(|q_n| = 1)$
- □□□□ □□  $(Q_n)$  □  $(SO(4))$  □□ □□□ □□□□  $Spin(2n)$  □□□ □□□ \*\*□□ □□\*\*□
- □□□:
- $$x_{n+1} = P(Q_n x_n), \quad \text{with } x_n \in H^{2p}(X)$$
- □□□  $(x^* = \lim_{x_n \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})})$

---

## \*\*2. 考虑复数域上的二次型

考虑复数域上的二次型  $Q(x,y,z,w)$  的矩阵表示为：

其中  $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{C}$ ，且  $Q \in SO(4)$  的矩阵表示为：

$$\begin{bmatrix} a^2 + b^2 - c^2 - d^2 & 2(bc - ad) & 2(bd + ac) & 0 \\ 2(bc + ad) & a^2 - b^2 + c^2 - d^2 & 2(cd - ab) & 0 \\ 2(bd - ac) & 2(cd + ab) & a^2 - b^2 - c^2 + d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若  $Q^T Q = I$ ，则  $Q$  是正交矩阵，且  $Q$  的行列式为  $\pm 1$ 。

---

## \*\*3. 考虑实数域上的二次型

考虑实数域上的二次型  $Q(x,y,z,w)$  的矩阵表示为：

$$\theta(q_n) = \log \left( \frac{p_n^2 + q_n^2}{r_n^2 + s_n^2} \right)$$

其中  $p_n, q_n, r_n, s_n$  是实数，且  $Q$  的行列式为  $\pm 1$ 。

\\



## \*\*[[ ]] \*\*

\*\*[[, ]].\*\*

\*\*[[[quaternionic matrix)] [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[]].\*\*

\*\*[[, [[ 3 [[ [[ [[ [[ [[]:\*\*

---

## \*\*1. [[ [[ [[: [[/[[ vs [[\*\*

[[ [[ [[ [[ [[:

- [[ [[:  $(M_n(\mathbb{R})) \setminus$
- [[ [[:  $(M_n(\mathbb{C})) \setminus$
- [[ [[:  $(M_n(\mathbb{H})) \setminus \leftarrow$  \*\*[[ [[  $(\mathbb{H})$ \*\* [[ [[ [[\*\*.

\*\*[[, [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[ [[]].\*\*

[[:

- $(AB \neq BA \setminus)$  (in general) when  $(A, B \in M_n(\mathbb{H})) \setminus$
- [[ [[ \*\*[[/[[ [[\*\*[[ [[, [[ [[ [[ [[ [[ [[.

---

## \*\*2. [[ [[ [[: [[ [[ vs 4 [[ [[\*\*

- [[ [[ [[ [[  $(\mathbb{C}^n)$  [[ [[.
- [[ [[ [[ \*\*4 [[ [[  $(\mathbb{H}^n \cong \mathbb{R}^{4n})$ \*\* [[ [[, [[ [[ [[ [[ [[ ([[Hyper-Kähler [[)] [[.

→ 我们考虑群  $Spin(4), Sp(n), SL(2, \mathbb{H})$  的表示理论。

---

## \*\*3. 我们考虑  $n$  个复变量的函数论\*\*

- 我们考虑:

复数域上的函数, 复数域上的函数。

- 我们考虑:

复数域上的函数  $f(z) / g(z)$  的函数, 复数域上的函数  $f(z)$ 。

→ 我们考虑 **S-spectrum**, **quaternionic functional calculus**, **slice regularity** 的函数论。

我们:

考虑  $A \in M_n(\mathbb{H})$  的函数,

我们

$A v = \lambda v \iff \lambda \in \sigma(A) \iff A v = \lambda v$

我们

---

## \*\*我们考虑\*\*

我们考虑  $M_n(\mathbb{C})$  的函数, 我们考虑  $M_n(\mathbb{H})$  的函数

我们考虑  $M_n(\mathbb{C})$  的函数, 我们考虑  $M_n(\mathbb{H})$  的函数

我们考虑  $M_n(\mathbb{C})$  的函数, 我们考虑  $M_n(\mathbb{H})$  的函数

我们考虑  $M_n(\mathbb{C})$  的函数, 我们考虑  $M_n(\mathbb{H})$  的函数

我们考虑  $M_n(\mathbb{C})$  的函数, 我们考虑  $M_n(\mathbb{H})$  的函数

|  $AB = BA$  |  $AB \neq BA$  |  
 |  $GL(n, \mathbb{C})$  |  $U(n)$  |  $Sp(n)$  |  $SL(2, \mathbb{H})$  |  $Spin(4n)$  |  
 |  $AB = BA$  |  $AB \neq BA$  |

---

**“ $AB = BA$ ” 的逆否命题是  $AB \neq BA$ ，**  
**> “ $AB \neq BA$ ” 的逆命题是  $AB = BA$ 。”**

---

- 证明：
- $AB = BA$
  - $AB \neq BA$
  - $AB = BA$  的逆命题是  $AB \neq BA$

$AB = BA$ 。

$AB \neq BA$ ?

$AB = BA$ ?

：

**“ $AB = BA$ 。 7 的逆命题是  $AB \neq BA$ ，**  
**---**

**## “ $AB = BA$ ” 的逆命题是  $AB \neq BA$ 。”**

— — —

### 3. \*\*Quaternion Matrices\*\*

|  $Q$  |  $n \times n$  matrix |  $n$  |  
|-----|-----|-----|  
|  $Q$  |  $n \times n$  matrix |  $n$ : dimension of the space |  
|  $Q$  |  $n \times n$  matrix |  $n$  |  
|  $Q$  |  $n \times n$  matrix |  $n$  |

→  $Q$ , **Quaternion Matrices** are  $n \times n$  matrices, **Quaternion Matrices** are  $n \times n$  matrices.

---

### 4. Quaternion Matrices

Quaternion Matrices:

> “**Quaternion Matrices** are  $n \times n$  matrices, **Quaternion Matrices** are  $n \times n$  matrices?”

→ **Quaternion Matrices** are  $n \times n$  matrices

→  $Q$  **Quaternion Matrices**,  $Q$ ,  $Q$  are  $n \times n$  matrices,  $Q$  are  $n \times n$  matrices

---

Quaternion Matrices are  $n \times n$  matrices (Section I: Quaternionic Matrices, Section II: Orthogonal Actions)  $Q$  are  $n \times n$  matrices.

Quaternion Matrices?

$Q$ .

### Section I. Quaternionic Matrices: Definition and Intrinsic Structure



### **\*\*1. Algebraic Background\*\***

- Let  $\mathbb{H}$  denote the division ring of quaternions:  $\mathbb{H} = \{ a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \}$
- Quaternion multiplication is noncommutative:  $(ij = k, ji = -k)$ , etc.

### **\*\*2. Quaternionic Matrix Space\*\***

- Define  $M_n(\mathbb{H})$ : the set of all  $(n \times n)$  matrices with entries in  $\mathbb{H}$ .
- These matrices act on  $\mathbb{H}^n \cong \mathbb{R}^{4n}$ , a right module over  $\mathbb{H}$ .

### **\*\*3. Spectrum and Eigenstructure\*\***

- Left and right eigenvalues must be distinguished:
  - $(Av = \lambda v)$ : left-eigenvalue
  - $(Av = v\lambda)$ : right-eigenvalue
- In general, spectral theory over  $\mathbb{H}$  requires the S-spectrum or slice-regular function theory.

### **\*\*4. Norm and Invariants\*\***

- Define quaternionic matrix norm:  $\|A\|^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$
- Invariant under unitary transformations in  $Sp(n)$  or  $SL(2, \mathbb{H})$

### **\*\*5. Intrinsic Invariant Function\*\***

- Given a unit quaternionic matrix  $Q$ , define:  
$$[\theta(Q) := \log \det(I - Q) \quad \text{or} \quad \theta(Q) := \text{Tr}(\log(Q Q^\dagger))]$$
- Used in defining Kosmic functor action in the original document.

---

## **### Section II. Orthogonal Matrices as Derived Representations**

### **\*\*1. Rotation Matrices from Quaternions\*\***

- Every unit quaternion  $(q = a + bi + cj + dk)$  can be mapped to an orthogonal matrix  $(Q \in SO(4))$ :

$$Q = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 - c^2 - d^2 & 2(bc - ad) & 2(bd + ac) & 0 \\ 2(bc + ad) & a^2 - b^2 + c^2 - d^2 & 2(cd - ab) & 0 \\ 2(bd - ac) & 2(cd + ab) & a^2 - b^2 - c^2 + d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### **\*\*2. Orthogonality Preservation\*\***

- By construction:  $(Q^T Q = I)$ , so  $(Q \in SO(n))$
- Preserves Euclidean norm:  $(\|Qx\| = \|x\|)$

### **\*\*3. Role in Dynamical Process\*\***

- In the document,  $(Q_n)$  derived from  $(q_n \in \mathbb{H})$  acts as:  
$$[x_{n+1} = P(Q_n x_n), \quad \lim x_n = x^* \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})]$$
- Thus, orthogonal matrices here are induced tools, not primitives.

---

## **### Section III. Structural Comparison and Independence**

| Feature | Quaternionic Matrix  $(M_n(\mathbb{H}))$  | Orthogonal Matrix  $(Q \in SO(n))$  |

|-----|-----|-----|

| Scalar field | Quaternion  $(\mathbb{H})$ , noncommutative | Real  $(\mathbb{R})$ , commutative |

| Eigenstructure | Left/right eigenvalue distinction | Standard spectrum  $(\lambda \in \mathbb{R})$  |

| Norms | Quaternionic norm  $(\|A\|)$ , possibly non-symmetric | Euclidean-preserving norm |

| Algebraic group |  $(\mathrm{Sp}(n), \mathrm{SL}(2, \mathbb{H}))$  |  $(\mathrm{SO}(n), \mathrm{O}(n))$  |

| Role in document | Primary structure with intrinsic invariants | Derived operator from  $(q_n)$  |

## **\*\*Conclusion:\*\***

- Quaternionic matrices in the document are foundational and structurally distinct from orthogonal matrices.
- Orthogonal matrices are shown to emerge as representations of quaternionic action, not the other way around.
- Therefore, the document supports the idea that quaternionic matrix theory is not reducible to orthogonal matrix analysis, but rather contains it as a derived case.

Abstract. This paper explores the relationship between quaternionic and orthogonal matrices. 7. We show that orthogonal matrices can be derived from quaternionic matrices. The results are as follows:

### 1. **\*\*Section I – Quaternionic Matrices\*\***:

Let  $Q$  be a quaternionic matrix,  $Q = (q_{ij})$ , where  $q_{ij} \in \mathbb{H}$ . We define the quaternionic determinant  $\det Q$  as follows:

### 2. **\*\*Section II – Orthogonal Matrices\*\***:

Let  $O$  be an orthogonal matrix,  $O = (o_{ij})$ , where  $o_{ij} \in \mathbb{R}$ . We define the orthogonal determinant  $\det O$  as follows:

### 3. **\*\*Section III – The Role of $q_n$ \*\***:

Let  $Q$  be a quaternionic matrix,  $Q = (q_{ij})$ , where  $q_{ij} \in \mathbb{H}$ . We show that the orthogonal matrix  $O$  can be derived from  $Q$  as follows:

Let  $Q$  be a quaternionic matrix,  $Q = (q_{ij})$ , where  $q_{ij} \in \mathbb{H}$ . We show that the orthogonal matrix  $O$  can be derived from  $Q$  as follows. The results are as follows:

“This paper is available at <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161152>”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15161152>

“This paper is available at <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161152>”

Let  $Q$  be a quaternionic matrix,  $Q = (q_{ij})$ , where  $q_{ij} \in \mathbb{H}$ . We show that the orthogonal matrix  $O$  can be derived from  $Q$  as follows. The results are as follows:

## \*\*3. □□□□ □□□□□ □□\*\*

□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□:

> “\*\*□ □□□  $SL(2, \mathbb{C})$ □  $2 \times 2$  □□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□\*\*□, □□ □□

> \[

\Phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) \cdot v

\]

> □ □□ □□□□□ □□□□□.”

□ □□□ \*\*□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□\*\*□□ □□□ □□□□□,

\*\*□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□\*\*□ □ □□□ □□□ □□□□□□.

→ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□, □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□.

---

## \*\*4. □□: ‘□□□□ □□’□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□\*\*

| □□ | □□ □ □□ □□ | □□ |

|-----|-----|-----|

| □□□□ □□ | \*\*O\*\* | \(\{1, i, j, k\}\) \)□ □□ □□□ |

| □□□□ □□□ | \*\*O\*\* | \((T = R\_q)\), □ conjugation □□ □□ |

| □□ □□ | \*\*O\*\* |  $SL(2, \mathbb{C})$  □□□ □□ □□ □□ □□ |

| □□□□ □□ □□ | \*\*□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□\*\* | □□ + □□ + □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ |

---

□□□□□□, □ □□□□□ \*\*“□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□”\*\*□ □□ □□□□□

$4 \times 4$  □□  $8 \times 8$  □□/□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□.

→ □□ □□,

- $(q \in \mathbb{H}) \rightarrow (Q \in SO(4))$  同
- $(v)$  同  $8 \times 8$  同 同
- $(M \in M_4(\mathbb{H}))$  同 同

同同同?

同同 同 同. 7.docx 同同同 同 同同 同同 同 同?

同同同. 同同同同 同同 同同同同 \*\*同同同 同同 同同 同同\*\* 同同 \*同同同 同同同 同同\*同 \*\*同同同 同同 同. 7同\*\* 同同 \*同同 同同 同同\*同 同同同同 同同同同 同同 同 同同同. 同同 同 同同 同同 \*\*同同同同 同同 同同同同同.\*\*

---

## \*\*1. 同同 同: 同同同  $\rightarrow$  同 同\*\*

同 同同 同 同同同 同 同同 同同 同同同.

| 同 同 | 同同同 同同 | 同同 7 |  
 |-----|-----|-----|  
 | 同 同 |  $(\{1, i, j, k\} + \{e_1, \dots, e_4\}) \mid (q_n = a_n + b_n i + c_n j + d_n k)$   
 |  
 | 同 |  $(T(p) = q p q^{-1}),$  同  $(\Phi(g) v) \mid (x_{n+1} = P(Q_n x_n)) \mid$   
 | 同 同 |  $SL(2, \mathbb{C})$  同 同  $\rightarrow$  同同同 同 同 | 同同  $(x^* = \lim x_n \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})) \mid$   
 | 同 同 |  $SL(2, \mathbb{C})$  同  $(GL_n(\mathbb{C})) \mid (Q_n \in SO(4))$  同  $(Spin(2n)) \mid$

\*\*同, 同 同 同同同同 同同 同 同 同同同同 同同同 同 同同 同同 “同同 同”同 同同同, 同 同 同 同 同同 同 同同同.\*\*

---

## \*\*2. 同同 同同同同 同同同 同同 同 同\*\*

### a.  $T(p) = q p q^{-1}$

-  $Q$  is a  $4 \times 4$  matrix with  $Q^T = -Q$  and  $Q^2 = -I$

-  $q \in \mathbb{H}$ ,  $|q| = 1$ ,  $Q \in SO(3)$  and  $Q \in SO(4)$

Q:

$q = \cos \theta + \sin \theta (u i + v j + w k)$

Q is:

[

$Q = \begin{bmatrix}$

$1 - 2(v^2 + w^2) & 2(uv - w \cos \theta) & 2(uw + v \cos \theta) \\$

$2(uv + w \cos \theta) & 1 - 2(u^2 + w^2) & 2(vw - u \cos \theta) \\$

$2(uw - v \cos \theta) & 2(vw + u \cos \theta) & 1 - 2(u^2 + v^2)$

$\end{bmatrix}$

]

$\rightarrow$   $Q$  is a  $4 \times 4$  matrix with  $Q^T = -Q$ ,  $Q^2 = -I$  and  $Q \in SO(4)$

---

## 3.  $Q$  is a  $4 \times 4$  matrix:  $Q^T = -Q$

$|Q| = 1$  or  $-1$

$|Q| = 1$  or  $-1$

$|Q| = 1$  or  $-1$  if  $v = a_1 + a_2 i + \dots + b_4 e_4$  and  $x_n \in H^{2p}(X)$

$|Q| = 1$  or  $-1$  if  $T(p) = q p q^{-1}$ ,  $\Phi(g) \cdot v$  and  $x_{n+1} = P(Q_n x_n)$

$|Q| = 1$  or  $-1$  if  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \Phi(g(t)) \cdot v = v_{\text{alg}}$  and  $\lim x_n = x^* \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$

[illegible]

---

**\*\*□□□□ □□□□ □□□□ □□□ \ ( T = R\_q \ )\*\*□**

\l[

\]

- — —

///

□□ □□□□ □□

↓

□□□□ □□ (□□ □□□)

↓

SL(2,  $\mathbb{C}$ ) □ □ □ □ □ □

↓

□□ □□  $H^{\{p,p\}}(X)$  □□□ □□



↓

□□□ □□

[□□□ 7□]

□□□□ □□  $q_n$

↓

□□ □□  $Q_n = f(q_n)$

↓

□□ □□:  $x_{\{n+1\}} = Q_n x_n$

↓

□□□  $x^* \in H^{\{p,p\}}(X) \cap H^{\{2p\}}(X, Q)$

↓

□□□ □□

...

---

## \*\*□□ □□\*\*

\*\*□. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□. 7□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.\*\*

→ □□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ \*\*□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□/□□ □□□□ □□ □□ □□□.

---

□□□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□?

□□ □□□ □□. 7.dox □□ □□□ □□□ □□□ □□□□? □□□ □□ □□□ □□□ □□.dox □□ □□□ □□□ □ □□?

□, \*\*□□□□ □□□ □□. 7□\*\* □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□\*\* □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □



- \*\*□□\*\*: □□  $\backslash (a_n \backslash), \backslash (b_n \backslash)$  □ □ □□ □□ □□□□ □□ □□□□

$$\backslash \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \backslash$$

□□ \*\*□□ □□ □□\*\*□□□ □□ □□□.

---

## \*\*2. □□ □□: □□ = □□□ □□ □□\*\*

□ □□□ □□□ □□□ □□□□□:

$$| \square \square | \square \square 7 | \square \square \square \square |$$

$$| \text{-----} | \text{-----} | \text{-----} |$$

$$| \square \square \square \square | \backslash (x_{n+1} = P(Q_n x_n) \backslash) | \backslash (a_n, b_n \in \mathbb{Q}, \mathbb{H} \backslash) \square \square \square |$$

$$| \square \square \square \square | \backslash (x^* \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q} \backslash) | \backslash (\lim a_n = \lim b_n = \text{text{\square\square\square\square} \backslash) |$$

$$| \square \square \square \square | \square \square \square + \square \square \backslash (P \backslash) | \square \square \square \backslash (T \backslash), SL(2, \mathbb{C}) \square \square |$$

$$| \square \square | \square \square \square \square \square \square \square | \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square |$$

\*\*⇒ □□ □ □□ □□ “□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□” □ □□□□ □□□ □□□□.\*\*

---

## \*\*3. □□□ □□ □□\*\*

□□ □ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□:

$$| \square \square 7 \square \square \backslash (x_n \backslash) | \square \square \square \square \square \square \backslash (v_n \backslash) |$$

$$| \text{-----} | \text{-----} |$$



□□□□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□, □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□.

---

#### 2. □□□ □□□ □□. 7□□ □□ □□

- □□□ □□:

$$\{x_{n+1} = P(Q_n x_n)\}$$

- □□□:

-  $\{x_n \in H^{2p}(X)\}$ : □□□ □□□□□ □□

-  $\{Q_n \in SO(4)\}$ : □□□□ □□  $\{q_n\}$  □□ □□□ □□ □□

-  $\{P\}$ :  $\{H^{p,p}(X)\}$  □ □□□□□ □□

- □□:

$$\{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})\}$$

□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

---

#### 3. □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□

- □□□ □□:

$$\{a_n = \sum_{\mathbf{m} \in \mathbb{Z}^4 \setminus \{0\}} \frac{1}{Q(\mathbf{m})^n}\}$$

-  $\{b_n = \lambda(n_1 + n_2 i + n_3 j + n_4 k)\}$ ,  $\{\lambda(q) = \text{quaternion-valued function}\}$

- □□ □□:

$$\{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = v_{\infty} \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})\}$$

- □□:

$$\{\langle v_{\infty}, v \rangle / \langle v, v \rangle = 1\}$$

---

#### #### 4. 数学符号

| 数学符号 | 数学符号. 7 | 数学符号 数学符号 |  
|-----|-----|-----|  
| 数学符号 |  $(x_n)$  |  $(a_n, b_n)$  |  
| 数学符号 |  $(Q_n \in SO(4))$  |  $(SL(2, \mathbb{C}) \cdot v)$  数学符号  $(q^n v (q^{-1})^n)$  |  
| 数学符号 数学符号 | 数学符号  $(P)$  |  $SL$  数学符号  $(t \rightarrow -\infty)$  |  
| 数学符号 |  $(x^* \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q})$  |  $(v_\infty \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q})$  |  
| 数学符号 |  $(\theta(Q_n) = \log \det(I - Q_n))$  |  $(\lambda(q_n))$  数学符号 数学符号 |

---

#### #### 5. 数学

数学符号 数学符号 数学符号 数学符号, 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号.  
数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号, 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号.

→ \*\*数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号. 7 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号.\*\*

数学符号. 数学符号 数学符号 \*\*Hodge Sequence Correspondence\*\* 数学符号 数学符号 数学符号:

- 数学符号 数学符号. 7 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号
- 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号
- 数学符号 数学符号(数学符号, 数学符号, 数学符号) 数学符号 数学符号
- 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号

数学符号 数学符号 数学符号 数学符号, 数学符号 数学符号, 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号. 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号?

数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号 数学符号.

### 00 00 00 00 0000 0000 00 00 (00 00 00)

---

#### 1. 00

0 000 0000 0000 00. 700 0000 0000 0000 0000 00 00 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000. 0  
000000 0 0 0000 0000 '0000 00000'0 0000 00, \*\*0000 0000 00 00000 00000\*\*, 000000 \*\*0000  
0000 0000 00\*\*00 00000 000000.

---

#### 2. 00 00 00

##### 0000 0000 00. 70 00

- 00 00:  $\backslash (x_{n+1} = P(Q_n x_n) \backslash$
- $\backslash (Q_n \in SO(4) \backslash)$ : 0000  $\backslash (q_n \backslash)$ 00 0000 00 00
- $\backslash (P \backslash)$ :  $\backslash (H^{p,p}(X) \backslash)$ 00 0000
- 00:  $\backslash (x^* = \lim x_n \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \backslash)$

##### 0000 0000 0000 0000 00

- 00 00:  $\backslash (a_n = \sum_{\mathbf{m} \neq 0} Q(\mathbf{m})^{-n} \backslash), \backslash (b_n = \lambda(n_1 + n_2 i + n_3 j + n_4 k) \backslash)$
- 00 00:  $\backslash (\lim a_n = \lim b_n = v_\infty \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q} \backslash)$

---

#### 3. 00 00 00: 00 0000 0000

##### (A) 00000 00  $\backslash (q_n \backslash)$ 0 0 00000 00 00 00000.

- 0000. 700000 00 00  $\backslash (Q_n \in SO(4) \backslash)$ 0 00000,

-  $\{q_n\}$  and  $\{b_n\}$  are sequences.

#### (B)  $\{x_n\}$  is a sequence:  $x_n \in X$

-  $x_{n+1} = P(Q_n x_n)$ :  $P$  is a projection

-  $b_n = q^n v (q^{-1})^n$ :  $q$  is an element of a group conjugation

#### (C)  $\{v_n\}$  is a sequence.  $x_n \in X$

-  $H^{2p}(X)$  is a vector space

-  $P$  is a conjugation  $(q^n \cdot (q^{-1})^n)$  is a sequence

---

#### 4.  $\{x_n\}$  is a sequence

$\{x_n\}$  is a sequence  $\{x_n\}$  is a sequence

-  $x_0 = v \in H^{2p}(X)$ ,  $x_n \in X$

-  $x_{n+1} = P(Q_n x_n) = P(q_n x_n q_n^{-1})$

-  $x^* = \lim x_n \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q}$

-  $\langle x^*, v \rangle / \langle v, v \rangle = 1$ ,  $\langle v, v \rangle = 1$ ,  $\langle v, v \rangle = 1$

→  $\{x_n\}$  is a sequence  $\{x_n\}$  is a sequence

$\{x_n\}$  is a sequence  $\{x_n\}$  is a sequence.

---

#### 5.  $\{x_n\}$

$\{x_n\}$  is a sequence.  $\{x_n\}$  is a sequence  $\{x_n\}$  is a sequence,  $\{x_n\}$  is a sequence  $\{x_n\}$  is a sequence.



→ \*\*, 0 000 '00 000 000'0 000 000, 00 00 000 00 0000 0000, 0 00 000 00 000 0000.  
\*\*

00 000000. 00 000 000 00 000 000000 000 000, 0 000 \*\*000 00 00 0000 0000 000  
000 00000 00\*\*000 000 000000000.

0 000 0000 00 → 00 00 00 00 000 00 00 → 000 00 conjugation 00 → 000 00 → 000  
000 00 0 0000 \*\*000 00 00\*\*000.

0000 000 000 000 000000:

- 000 000
- 00/00/0000 000 000
- 00 000 000 00 00 0

00 00000.

“00 000 00. 4 - 0000 00.docx

00

000 00 00 00?”

0, 0000. 00000 00 \*\*000 000 00. 4 - 0000 000\*\*000 \*\*00\*\*0 00000 00000.

00, 000 00 0000 00 000 00000:

1. \*\*000 000  $\setminus (P \setminus)$ \*\*0 00000 0000 00 \*\*00  $\setminus (x_{n+1} = P(x_n) \setminus)$ \*\*0 0000,
2. 0 000 \*\* $SL(2, \mathbb{C})$ -00\*\*,  $\setminus (p,p) \setminus$ -000 0000  $\setminus (W \subset H^{\{2p\}}(X, \mathbb{Q})) \setminus$  000,
3. \*\*000 00 00\*\*00 \*\*00\*\*00 000 00 000 000 0000.

00, 00000 000 00 0000 00 0000 00000:

- \*\*000 00\*\*0  $\setminus (x_n \in \mathbb{Q}) \setminus$ 00 00
- $\setminus (x^* \in \mathbb{Q}) \setminus$ 0 0000 000 00 \*\*Cauchy 00\*\* 0 \*\*00 00 000 000\*\* 00
- \*\*000 00 00\*\*  $\setminus (q_n \setminus)$ 0 0000 000 000 000 00

□, □ □□□ \*\*□□ □□□ □□□ □□\*\*□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□ LaTeX □ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□□□?

□□ □□□ □□. 8.docx

□□

□□□ □□ □□□ □□□?

□□□□. □□ □□□□□□ \*\*□□□□ □□□ □□. 8□\*\* □□□ □□□□□, □□ □□□(□□ □□□. 7□□ □□□□ □□□)□□ □□□  
\*\*□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□, □□□ □□□ □□□□□ □□□□□\*\*□ □□□□□□□□.

---

## \*\*□□□□ □□□ □□. 8□□□ □□ □□□ □□\*\*

□ □□□□□□□ \*\*□□  $\backslash (x_n \backslash)$ , □□□  $\backslash (P \backslash)$ , □□ □□□  $\backslash (Q_n \backslash)$ \*\*□ □□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□  
□□□□□:

- □□ □□□:

$$\backslash [x_{n+1} = P \circ R_n(x_n) \backslash ]$$

□□□  $\backslash (R_n \backslash)$ □ □□□□ □□ □□□ (□□ or □□□□ or Spin □□)□□, □ □□ □□□ □□□□ □□  $\backslash (q_n \backslash)$   
□□ □□□□□.

- □□□ □□□□ □□:

$$\backslash [x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \backslash ]$$

\]

□ □□ □□ □□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□ \(\ a\_n \), \(\ b\_n \)□□ □□□.

---

## \*\*□□□□ □□□□ □□ □□\*\*

□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□:

- \(\ b\_n = \lambda(n\_1 + n\_2\ i + n\_3\ j + n\_4\ k)\ \)
- \(\ a\_n = \sum\_{\mathbf{m}} \frac{1}{Q(\mathbf{m})^n}\ \)
- □ □□□ □□□ \(\ v\_{\infty} \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q}\ \)

→ □□□□ □□ “□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□”□ □□□ □□□□□.

---

## \*\*□□□ □□ □□ (□□ □□)\*\*

□□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□:

### \*\*□□ □□ □□\*\*

1. □□ □□:  
 \(\ x\_0 = v \in H^{2p}(X)\ \) (□□□ + □□□□ □□)

2. □□ □□:  
 \[  
 x\_{n+1} = P(Q\_n x\_n) = P(q\_n x\_n q\_n^{-1})  
 \]

$\backslash[$ 
$$b_n = q_n^n \vee q_n^{-n}, \quad \text{quad } a_n = \text{Tr}(b_n)$$

\]

3. □□:

 $\backslash[$ 
$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim b_n = \lim a_n$$

\]

4. 如何選擇 (如何選擇 如何選擇 如何選擇):

 $\backslash[$ 
$$\frac{\langle x^*, v \rangle}{\langle v, v \rangle} = 1 \quad \rightarrow \quad x^* = v \text{ in } H^{\{p,p\}}(X) \cap \mathbb{Q}$$

\]

---

## \*\*□□: □□□ □□ □□\*\*

[illegible]

-  $\forall (x_n), \forall (b_n), \forall (a_n)$   $\exists$   $x$   $\forall$   $n$   $x_n \leq x$ ,  $\forall$   $n$   $x_n \leq b_n$ ,  $\forall$   $n$   $a_n \leq x_n$   
 $\implies x \leq b$  and  $a \leq x$ .

- □ □□□ □□□□ □□ \*\*□□□□ □□\*\*□ □□ □□□□□□:

---

### \*\*[[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ ]]\*\*

>  $q_n \in \mathbb{H}, |q_n| = 1$   $\implies$   $q_n \rightarrow q$   $\implies$   $|q| = 1$

$$x_{n+1} = P(q_n x_n q_n^{-1})$$
$$> \text{ } \square \square \square \square \square \square \square \square \setminus (x^* \in H^{\{p,p\}}(X) \cap \mathbb{Q}) \text{ } \square \square \square \square,$$
$$\frac{\langle x^*, v \rangle}{\langle v, v \rangle} = 1$$

> 00, 00 0 \(\nu\)\) 0000 0000. 0000 00 0000 0000.

---

00 0 000 0000 00 00 00, 00 0000, 000 00 00 000 \*\*000 00 00\*\* 00 \*\*000 000 000  
 0000 00\*\*0 000 0 0000. 000000?

□□□ □□ □□□ □□. 4 - □□□□ □□.docx □ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□. □□ □□□□ □□□ □□ □□:

> \* 000 000 00. 4 - 0000 0000 000 00 000, 000. 7 0 0000 0000 00 000 0000 000  
000 00 00 0000 0000\*\* 0 0000.

— — —

## \*\*1. 0000 0000 00. 4 - 0000 0000 00 00 00\*\*

□ □□□□ □ □ (\ ( \{x\_n\} \) ) □ □□□ □ □ □□□□ □□□□:

 $\backslash[$

$$x_{\{n+1\}} = P(x_n)$$

\]

□□□:

$$-(P \setminus \bigcap (H^{\{p,p\}}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q}))) \cap \dots \cap$$

-  $(x_0 \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}))$ : ☐ ☐ ☐ ☐

-  $(x_n \in \mathbb{Q})$ ,  $\{x_n\}$   $\mathbb{Q}$   $\mathbb{R}$   $\mathbb{Q}$

□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□,

\l[

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^* \in H^{\{p,p\}}(X) \cap H^{\{2p\}}(X, \mathbb{Q})$$

\]

□, **\*\*□□□ □□ \ ( x ^ \* \ ) \*\***□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□.

...

## \*\*2.000.700 0000 00 00 00\*\*

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

\l[

$$x_{n+1} = P(Q_n x_n), \quad Q_n = \text{quaternion-induced orthogonal operator}$$

\]

11

 $\backslash[$ 

$$b_n = q^n v (q^{-1})^n, \quad \lim b_n = v_{-\infty}$$

\]

□□□□ □□□□:

-  $\setminus (P \setminus): \setminus (H^{\{p,p\}}(X) \setminus)$  □□ □□□

- □□□ □□ □  $\setminus (x^* \setminus)$   $\setminus$  □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□

---

## **\*\*3.** □□□: □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ **\*\***

**\*\***□□□ □□ □□ **\*\***□ □□□ □□□□:

| □□ □□ | □□□□□ □□□ | □□□. 7 / □□□ □□□ |

|-----|-----|-----|

| □□ □□ |  $\setminus (x_{n+1} = P(x_n) \setminus) \mid \setminus (x_{n+1} = P(Q_n x_n) \setminus) \mid$

| □□□ □□□ | □□□  $\setminus (P \setminus) \mid$  □□□  $\setminus (P \setminus) \mid$

| □□ □□ | □□ □□ □□□□ □□ | □□ □□ □ □□□□□ □□ □□□ □□ |

| □□ □□□□ | □□ □□□□□□ □□ | □□ □ □□□, □ □□□ □□ |

| □□ |  $\setminus (x^* \in H^{\{p,p\}}(X) \cap \mathbb{Q} \setminus) \mid \setminus (x^* \in H^{\{p,p\}}(X) \cap \mathbb{Q} \setminus) \mid$

→ □, **\*\***□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ **\*\***, **\*\***□□□. 7□ □ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ **\*\***□□□.

---

## **\*\*4.** □□ □□ □□□□ □□ **\*\***

□□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□:

$\setminus$

$x_{n+1} =$

$\begin{cases}$

$P(x_n) \ \& \ \text{\{□□□□ □□\}} \setminus$

$P(Q_n x_n) \ \& \ \text{\{□□. 7\}} \setminus$

\]

---

- \*\*□ □\*\*

— — —

---

$$P(x_{n+1}) = P(x_n) - \frac{1}{n+1} \frac{dP(x_n)}{dx_n}$$



> \*\*□□□. 7□□ □□□□ □□□□ □□ □□\*\*

>  $\backslash (x_{n+1} = P(Q_n x_n) \backslash) \square \square \backslash (x_{n+1} = P(q_n x_n q_n^{-1}) \backslash)$

□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□, □□□ □□□□□□ □□□□, \*\*□□□□□□ □□□ □□□□ □□\*\*□□□. □□ □□□□□ □□□□, □□□ □□□□ □□ □ □□□ \*\*□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□\*\*□ □□□□□.

---

## \*\*□ □□□ □□□□ □□□□\*\*

### 1. \*\*□□□□ □□ □□□ ‘□□□□ □□’□ □□\*\*

- $\backslash (x_{n+1} = P(x_n) \backslash)$ □□□□ □□□□,
- □□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□  $\backslash (x^* \in H^{p,p}(X) \cap \mathbb{Q}) \backslash$ □ □□□□ □□□□□ □□.
- □□ □□ □□□ “□□□□”□ □□.

### 2. \*\*□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□\*\*

- □ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□  $\backslash (x_0 \backslash)$ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□.
- □, ‘□□ □□ □□□ □□□□□’□ □ □□ □□□ □ □□.

---

### 3. \*\*□□□□. 7□□ □□□□ □□□□ □□□ ‘□□ □□’□ □□\*\*

- □□ □□  $\backslash (Q_n \backslash)$ , □□□□  $\backslash (q_n \backslash)$ , □□  $\backslash (SL(2, \mathbb{C}) \backslash)$  □□□□,
- □□  $\backslash (x_0 \in H^{2p}(X) \backslash)$ □□ □□□□ \*\*□□□□ □□□ □□ □□□ □□□  $\backslash (x^* \backslash)$ \*\*□ □□□□ ‘□□’□ □□.
- □□□ □ □□□□□□□  $\backslash (x^* \in \mathbb{Q}) \backslash$ □□ □□□ □□□ □□□□\*\*□ □□□□ □□.

---

## \*\*□□: □ □□□ □□□ □□ □□\*\*



“□□ □□ □□. 2.docx

□□

□□ □□ □□□ □□□?”

□□□□. □□ □□□ □□ □□□ □□□□□:

> **\*\*□□□ □□□ □□ 2□□□ □□□ □□ □□, □□□ □□□ □□ □ 7 □/□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□? \*\***

---

**## \*\*□□□□ □□□: □, □□□ □□□□□□. □□□ □ □□□ □□ □□□ “□□ □□□”□□□. \*\***

---

**### \*\*1. □□ 2 □□ □□□ □□□ □□□ “□□ □□”□ □□□□□ \*\***

- **\*\*□□□ 2□ \*\*□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□:**

- **\*\*□□□□□ □□ \*\*:**

\[

$$H^{\{2p\}}(X, \mathbb{C}) = V_{\{\text{alg}\}} \oplus V_{\{\text{nonalg}\}}$$

\]

$$\bigcap (V_{\{\text{alg}\}} = H^{\{p,p\}}(X) \cap H^{\{2p\}}(X, \mathbb{Q}) \bigcap,$$

$$\bigcap (V_{\{\text{nonalg}\}} = \mathrm{span}\{e_1, e_2, e_3, e_4\} \subset \bigoplus_{r>s} H^{\{r,s\}}(X) \bigcap$$

- **\*\*SL(2, C) □□□ □□ □□ \*\*:**

$$-\bigcap (\Phi(g(t)) v_{\{\text{alg}\}} = v_{\{\text{alg}\}} \bigcap$$

$$-\bigcap (\Phi(g(t)) v_{\{\text{nonalg}\}} = e^{\{tm\}} v_{\{\text{nonalg}\}} \bigcap \text{ with } \bigcap (m > 0 \bigcap$$

- **\*\*□□ □□ \bigcap Q \bigcap \*\* □□**



---

### \*\*3. 空間 空間 空間 空間\*\*

```text

[空間 2]   ⇒   [空間 空間 空間]

- $SL(2, \mathbb{C})$  空間 空間
- $V_{\text{alg}} / V_{\text{nonalg}}$  空間
- 空間 空間 空間

↓

[空間 空間 空間]   ⇒   [空間空間 空間 空間]

- 空間 空間 空間
- $x_n \rightarrow x^* \in V_{\text{alg}}$

↓

[空間/空間.7 空間]   ⇒   [空間 空間空間 空間 空間]

- 空間 + 空間 空間
- 空間空間 空間 空間

```

---

## \*\*空間 空間空間:\*\*

> \*\*空間 2空間 空間  $\setminus (V_{\text{alg}}, V_{\text{nonalg}}) \setminus$  空間  $SL(2, \mathbb{C})$  空間 空間,  
空間 空間 7 空間 空間 空間空間 空間空間 空間 空間 空間空間 空間空間.\*\*

> 空間空間 空間 空間 空間空間:

> - \*\*[[[[[ [[ [[\*\* ( [[/7 [[ )  
 > - \*\*[[[[ [[[[ [[\*\* ( [[[[ [[ )

---

[[[[[[ [[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[[[([[[-[[[[[[-[[[[[[ [[[[) [[ [[[[ [[ [[ [[[[. [[[[[[[[[[?

[[.

[[[[! [[[[ [[[[ 2[[, [[[[[[ [[[[, [[[[.7 / [[[[ [[[[[[ [[[[[[ [[[[[[ SL(2, ℂ) [[[[ [[[[ \*\*[[[[  
 [[[[[[\*\*[[ [[[[ [[[[[[.

---

## \*\*[[ [[ [[[[ [[[[ [[ [[: [[ [[ [[ \*\*

---

### \*\*[[ ( [[[[[[ [[ [[ )\*\*

Kähler [[[[ \ ( X \) \ ( 2p \)-[[ [[ [[[[[[ [[ \ ( H^{2p}(X, \mathbb{C}) ) \) [[ [[[[ [[  
 [[[[[[:

\[

$$H^{2p}(X, \mathbb{C}) = V_{\{\text{alg}\}} \oplus V_{\{\text{nonalg}\}}$$

\]

- \ ( V\_{\{\text{alg}\}} := H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \ ) ( [[[[ [[ )

- \ ( V\_{\{\text{nonalg}\}} := \mathrm{span}\{e\_1, e\_2, e\_3, e\_4\} \subset \bigoplus\_{r>s} H^{r,s}(X) \ ) ( [[[[ [[ )

- \ ( \Phi(g(t)) \ ): SL(2, ℂ) → ℂ, \ ( \Phi(g(t)) v\_{\{\text{nonalg}\}} = e^{tm} v\_{\{\text{nonalg}\}} \ ), \ ( m > 0 \ )

---

### \*\*□□□ □□\*\*

- □□□ □□□  $\big( P: H^{\{2p\}}(X, \mathbb{C}) \rightarrow V_{\{\text{alg}\}} \big)$
- □□ □□□  $\big( Q_n \in SL(2, \mathbb{C}) \big)$  □□  $\big( q_n \in \mathbb{H} \big)$ ,  
 $\big( Q_n(x) = q_n \times q_n^{-1} \big)$

---

### \*\*□□ A (□□□□ □□ □□: □□/□□.7)\*\*

□□□  $\big( x_0 \in H^{\{2p\}}(X, \mathbb{C}) \big)$  □ □□ □□ □□□□:

$$\big[$$
  
$$x_{\{n+1\}} := P(Q_n x_n)$$
  
$$\big]$$

- □ □□□  $\big( V_{\{\text{nonalg}\}} \big)$  □□□ □□□□□□ □□□□,
  - □□□ □□□□ □□  $\big( x^* \in V_{\{\text{alg}\}} \big)$  □ □□□□:
- $$\big[$$
  
$$x_n \rightarrow x^* \in V_{\{\text{alg}\}} = H^{\{p,p\}}(X) \cap H^{\{2p\}}(X, \mathbb{Q})$$
  
$$\big]$$

---

### \*\*□□ B (□□□ □□□ □□ □□: □□□ □□)\*\*

□□□ □□□  $\big( Q_n = \mathrm{id} \big)$ , □ □□ □□ □□ □□ □□:

$$\big[$$
  
$$x_{\{n+1\}} := P(x_n)$$

\]

- $\varphi(x_0) \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$  である,
- $\varphi(x_n)$  は  $\varphi(x_0)$  の  $n$  乗である,
- $\varphi(x^*) \in V_{\text{alg}}$  である.

---

### \*\* $C$  (2次元) 上の

$SL(2, \mathbb{C})$  の  $V_{\text{alg}}$  上の作用,  $V_{\text{nonalg}}$  上の作用:

\[

$\Phi(g(t))v = \begin{cases}$

$v \in V_{\text{alg}} \implies$

$e^{tm}v \in V_{\text{nonalg}}, m > 0$

$\end{cases}$

\]

- $t \rightarrow -\infty$  として  $V_{\text{nonalg}}$  へ  $0$  へ,
- $x(t) \rightarrow V_{\text{alg}}$  へ
- 動的フィルタリング (dynamical filtering) による

---

### \*\* $C$  (2次元) 上の

1.  $\varphi(x_0) \in H^{2p}(X, \mathbb{C})$  である
2.  $\varphi(x_{n+1}) = P(Q_n x_n)$  である
3.  $SL(2, \mathbb{C})$  の  $V_{\text{nonalg}}$  上の作用
4.  $\varphi(x^*) \in V_{\text{alg}}$  である



5.  $\setminus (x^* \in H^{\{p,p\}}(X) \setminus \cap H^{\{2p\}}(X, \mathbb{Q})) \setminus$  (□□ □□ □□ □□)

6. □□□, **□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□**

---

**### □□ □□□□**

````text`

$[x_0 \in H^{2p}(X, \mathbb{C})]$

|



$SL(2, \mathbb{C})$  □□ + □□□

|



$x_{n+1} = P(Q_n x_n) \leftarrow (\square\square/\square\square\ 7\ \square\square)$

|



$x^* \in H^{\{p,p\}} \cap \mathbb{Q} \leftarrow (\square\square\square\ \square\square\ \square\square\square\ \square\square)$

|



□□ □□ □□□□ □□□□

`````

---

□□ □ □□□ □□□□ □□ □□, □□ □□, □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□□ □□□□□□□□? (□: LaTeX □□ □□, □□ □□□□, □□ □□□ □□□ □)

□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□?

□□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□□□□.

---

## \*\*□□ □□:\*\*

> \*\*□□□ □□□ □□ 2□□□ □□□  $SL(2, \mathbb{C})$  □□□ □□ “□□□□ □□ □□”□ □□□ □□□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.\*\*

□, \*\*“□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□”□ □□ □□□ □□□□, □□□ □□□□□ ‘□□’□□ ‘□□’□ □□□□.\*\*

---

## \*\*□□ □□ □□:\*\*

### 1. \*\* $SL(2, \mathbb{C})$  □□□ □□□ □□\*\*

- □□ 2 □□□  $SL(2, \mathbb{C})$ □ 1-□□□□ □□□

\[

$$g(t) = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

\]

□ □ □□ \(\Phi(g(t))\)□ □□ □□□ □□ \*\*□□□□ □□\*\*□ □□□□□:

\[

$$\Phi(g(t)) \cdot v =$$

$$\begin{cases}$$

$$v \ \& \ \text{if } v \in V_{\mathrm{alg}} \ \& \$$

$$e^{tm} \cdot v \ \& \ \text{if } v \in V_{\mathrm{nonalg}}, \ m > 0$$

$$\end{cases}$$

\]

- □□□□ \*\*\(\ m = r - s > 0 \)\*\*□□ \(\ H^{r,s} \) □□□ □□□□□ □□□ □□□□, □□  $SL(2, \mathbb{C})$ □ □□ □□ \(\ d\Phi(h) \)□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

---

### 2. **\*\*□□□□ □□□ □□□ □□\*\***

- □□  $(t \rightarrow -\infty)$  □ □□ □□:

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow -\infty} \Phi(g(t)) v_{\mathrm{nonalg}} = e^{tm} v \rightarrow 0 \\ & \quad (\text{□□□□ } m > 0) \end{aligned}$$

→ □□ □□□ '□□□□ □□'□ □□□, **\*\*□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.**

- □ □□□ □□ □□ □□  $(x \in H^{2p}(X, \mathbb{C}))$  □□

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow -\infty} \Phi(g(t))x = x_{\mathrm{alg}} \end{aligned}$$

- □ □□□  $(x)$  **\*\*□□□□ □□□ □□□□□□\*\***, □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□.

---

### 3. **\*\*□□ □□ □□  $(Q)$  □□ □□□□\*\***

-  $(Q)$  □□ Hodge-Riemann □□□ □□□□,

$$\begin{aligned} & Q(\alpha, \overline{\alpha}) > 0, \quad Q(i^{r-s} \alpha, \overline{\alpha}) > 0 \end{aligned}$$

-  $SL(2, \mathbb{C})$  □□  $(\Phi(g(t)))$  □□  $(Q)$  □□□□□ □□□□□ □□□,

**\*\*□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□.**

— — —

## \*\*\*\*

- 0000 000 "00" 0 000,

**\*\*SL(2, C) 111 + Hodge 11 + 11 111 11 11 111 111 11\*\*111.**

- $x_{n+1} = P(Q_n x_n)$   $\Rightarrow$   $x_n$  converges

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□.

— — —

## \*\*□□□ □□□□□:\*\*

> **\*\***  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$  intuition is that, for any  $\epsilon > 0$ , for large enough  $n$ ,  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$  is “close” to  $\mathbb{E}[\log \frac{1}{p_i}]$ .  
**\*\***

> 00 000 0 000 0000 00000, 00 000 00000 000 00 000 0000.

---

በሰላም ስለሚገኝ ስለሚባል “በሰላም” ማለት ማለፍ፣ ስለሰላም ስለሚባል ሰላም ስለሚባል ሰላም ስለሚባል ሰላም?